

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG 2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1115/UBND-KN
V/v hướng dẫn một số biện pháp kỹ
thuật cần triển khai đầu vụ ĐX
2024 - 2025

Phường 2, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- BCS Khu phố 5,
- HTX Trí Bưu.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn nhiệt độ từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025 phổ biến mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ và tần suất hoạt động không khí lạnh (KKL) vụ Đông Xuân 2024-2025 ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn TBNN, KKL có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12/2024, trong đó rét đậm rét hại xuất hiện nửa cuối tháng 12/2024. Lượng mưa tháng 01/2025 ở mức xấp xỉ cao hơn TBNN và tháng 02 - 3/2025 ở mức xấp xỉ thấp hơn TBNN, đây là thời điểm bà con nông dân đồng loạt xuống đồng gieo sạ lúa theo lịch thời vụ nên nguy cơ cao bị ngập úng, ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa mới gieo.

Để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với thời tiết bất thuận, tổ chức sản xuất thời vụ Đông Xuân 2024-2025 theo đúng kế hoạch đồng thời giúp cây trồng sinh trưởng - phát triển tốt, hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. UBND phường đề nghị HTX Trí Bưu tùy theo điều kiện thực tế của khu phố để triển khai một số biện pháp kỹ thuật đầu vụ như sau:

1. Đối với cây lúa:

- Phát động toàn dân ra quân ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, thu gom bắt ốc bươu vàng, diệt trừ cây mai dương và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

+ Làm thủy lợi nạo vét kênh mương để khơi thông dòng chảy, Tiến hành dọn sạch cỏ dại trên bờ vùng, bờ thửa; Làm đất sớm, kết hợp bón vôi nhằm hạn chế nguồn bệnh phát sinh; Sử dụng các loại chế phẩm sinh học phân hủy rơm rạ nhằm phân hủy xác thực vật, giảm mầm mống dịch hại, tránh ngộ độc hữu cơ cho cây lúa và tăng độ phì cho đất;

+ Đối với chuột: Tổ chức đợt ra quân diệt chuột tập trung, tranh thủ diệt chuột trước khi vào vụ sản xuất bằng nhiều biện pháp tổng hợp: Canh tác, thủ công, hóa học, sinh học, trong đó ưu tiên thủ công như đào bắt, dùng các loại bẫy, sử dụng thuốc thế hệ mới có chứa hoạt chất: Thuốc có các hoạt chất: Diphacinone,

Brodifacoum, Bromadiolone (Racumin 0,75TP, Rat K2% DP, Gimlet 0,2GB, Klerat,...).Phát động diệt chuột liên vùng, liên thôn, kết hợp diệt chuột ngoài đồng, ven làng với việc diệt chuột trong khu dân cư, trong các hộ gia đình.Tuyệt đối không sử dụng xung điện để diệt chuột.

+ Đối với ốc bươu vàng: Ưu tiên các biện pháp thủ công, bắt ốc và thu gom ổ trứng đem tiêu hủy là biện pháp hiệu quả, dễ thực hiện, ít ảnh hưởng đến môi trường, nếu mật độ cao, diện tích gây hại lớn và ốc tuổi nhỏ khó áp dụng biện pháp thủ công thì có thể dùng các loại thuốc phun có hoạt chất Niclosamide (như AnPuma 700 WP, Molluska 700WP, Pisana 700WP,...) hoặc thuốc rải dạng hạt có hoạt chất Metaldehyde, như: Honeycin 150SC,... để diệt trừ. Lưu ý khi sử dụng thuốc trên ruộng phải có nước, thuốc diệt OBV độc đối với động vật thủy sinh nên cần thận trọng khi sử dụng gần khu vực nuôi trồng thủy sản;

- Tổ chức gieo cấy đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hải Lăng và Phòng Kinh tế thị xã Quảng Trị đã ban hành; Sử dụng giống lúa ngắn ngày và cực ngắn (thời gian sinh trưởng khi gieo thẳng $\leq 120 \pm 5$ ngày) phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, tập trung sản xuất giống có thị trường tiêu thụ tốt, đầu ra ổn định, có hiệu quả kinh tế cao. Chỉ đưa vào sản xuất đại trà các giống lúa có nguồn gốc, có phẩm cấp, tuyệt đối không gieo các giống chưa được phép lưu hành trên địa bàn tỉnh, Không nên sử dụng thóc thối làm giống. Có kế hoạch dự trữ nguồn giống dự phòng (Giống có thời gian sinh trưởng ngắn và cực ngắn như: HN6, An sinh 1399, TBR 97 cực ngắn,...) để gieo lại trên các diện tích bị thiệt hại đầu vụ do ngập úng, mưa rét gây nên.

- Cần xử lý giống bằng nước ấm 54°C (3 sôi 2 lạnh) trong thời gian từ 15-20 phút để kích thích giống nảy mầm và phòng trừ nấm bệnh trên vỏ hạt, khi gặp trời rét (nhiệt độ dưới 18°C) phải ngâm giống với nước ấm, chú ý thay nước tránh để hiện tượng lúa bị chua trong quá trình ngâm giống. Ưu tiên sử dụng công cụ sạ hàng để gieo sạ. Vì vậy, cần ngâm ủ giống đảm bảo mầm và rễ ra vừa phải để sạ hàng thuận lợi.

- Để hạn chế rầy lưng trắng truyền bệnh lùn sọc đen (LSD) trong giai đoạn đầu của cây lúa nên xử lý giống trước khi gieo bằng thuốc có hoạt chất: Thiamethoxam, Imidacloprid (Cruiser 350 FS, Gaucho 600 FS...) để hạn chế bọ trĩ, rầy lưng trắng truyền bệnh lùn sọc đen (LSD) trong giai đoạn đầu của cây lúa; thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh LSD sớm và áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. (chú ý sau gieo 7-30 ngày đầu là thời kỳ miễn cảm của cây lúa với bệnh LSD).

- Gieo sạ mật độ thích hợp, không nên gieo quá dày, lượng giống gieo sạ từ 80-100 kg/ha để giảm chi phí giống, phân bón và thuốc BVTV; Bón phân cân đối, ưu tiên sử dụng các loại phân bón chậm tan (bón phân đạm hạt vàng Urê 46a+, lân nung chảy,...), tăng cường bón phân hữu cơ, phân vi sinh, bón phân lân và kali, tập trung lượng phân bón lót ngay từ đầu vụ; tưới dặm kịp thời, bón thúc đẻ nhánh sớm, không bón thừa đạm, kết hợp bổ sung các loại phân bón qua lá và chế phẩm điều hòa sinh trưởng nhằm kịp thời bổ sung và điều chỉnh dinh dưỡng để tăng khả năng chống chịu, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết xấu và sâu bệnh đối với cây trồng.

- Chỉ sử dụng thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ trên 18°C; đối với thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm cần căn cứ thời tiết và sinh trưởng của cây lúa có ít nhất 3 lá thật trở lên mới được phun.

- Đẩy mạnh ứng dụng thiết bị bay không người lái (Dron) vào việc phun thuốc BVTV, thuốc trừ cỏ sau gieo sạ, bón phân...nhằm giảm bớt sức lao động, bảo vệ sức khỏe và tăng hiệu suất hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

- Thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện sớm những thiệt hại do thời tiết bất thuận và dịch hại để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Lưu ý: Không bón chế phẩm vi sinh cùng với hoặc các loại phân hóa học. Tiến hành bón với trước khi cày đất, ít nhất 7 ngày sau mới tiến hành bón chế phẩm vi sinh, sinh học để đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thuận